

## Fiche Mémo

# Rhinopharyngite aiguë et angine aiguë de l'enfant

Novembre 2016

Le but de cette fiche mémo est de favoriser la prescription appropriée d'antibiotiques, afin de diminuer les résistances bactériennes pouvant conduire à des impasses thérapeutiques. Le choix de l'antibiotique, sa dose et sa posologie sont les éléments à prendre en compte pour une prescription adaptée.

→ **Pas d'antibiotique** chez un enfant :

- ayant une **rhinopharyngite aiguë** ;
- de moins de 3 ans ayant une **angine aiguë** ;
- de 3 ans et plus ayant une **angine aiguë** avec un test diagnostique rapide (TDR) négatif.

→ **Chez un enfant de 3 ans et plus** ayant une **angine aiguë** avec un TDR positif :

- amoxicilline, 50 mg/kg/j, pendant 6 jours.
  - ▶ En cas d'allergie aux pénicillines sans contre-indication aux céphalosporines, le traitement recommandé est la cefpodoxime proxétil : 8 mg/kg/j, pendant 5 jours.
  - ▶ En cas de contre-indication aux bêtalactamines, les antibiotiques suivants peuvent être utilisés :
    - azithromycine, 20 mg/kg/j, pendant 3 jours ;
    - clarithromycine, 15 mg/kg/j, pendant 5 jours ;
    - josamycine, 50 mg/kg/j, pendant 5 jours.