

COVID-19

POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE



25 août 2022 / N°130

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires¹ et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au 24 août 2022.

Chiffres clés

En semaine 33 (15-21 août 2022)

En comparaison avec S32 (08-14 août 2022)



Au 22 août 2022

En comparaison avec le 15 août 2022



*S33 : données non consolidées.

¹Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance COVID-19 : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Cnam, Inserm, Insee.

Points clés

Situation épidémiologique

En semaine 33, la situation épidémique a continué de s'améliorer, mais de manière moins marquée, avec des indicateurs virologiques en légère baisse au niveau national et une tendance à la stabilisation dans certaines régions. Les indicateurs hospitaliers continuaient de diminuer.

• Métropole :

- Baisse moins marquée du taux d'incidence dans toutes les classes d'âge
- Tendance à la stabilisation du taux d'incidence dans certaines régions
- Diminution des taux d'admission à l'hôpital se poursuivant sur l'ensemble du territoire

• Outre-mer :

- Poursuite de la hausse du taux d'incidence à La Réunion
- Augmentation de l'incidence en Martinique

Variants

- Sous-lignées d'Omicron : BA.5 omniprésent sur le territoire avec 94% des séquences lors de l'enquête Flash S32 (08/08)

Prévention

- Vaccination au 22 août 2022 (données Vaccin Covid) :
 - Couverture vaccinale de la dose de rappel toujours stable à 75,3% chez les 18 ans et plus et à 85,3% chez les 65 ans et plus
 - Seconde dose de rappel : 26,4% des 60-79 ans (32,6% de ceux qui y étaient éligibles selon le délai depuis la dernière injection) et 34,6% des 80 ans et plus (45,7% de ceux qui y étaient éligibles) l'avaient reçue
- Dans le contexte des congés d'été et des activités propices à une augmentation de la transmission du virus, le respect des mesures combinées demeure primordial :
 - vaccination à jour contre la COVID-19 ;
 - isolement en cas de test positif pour la COVID-19 et/ou de symptômes ;
 - application des gestes barrières : port systématique du masque en présence de populations à risque ou en cas de promiscuité dans les espaces clos (notamment dans les transports en commun ou lors de grands rassemblements) et renforcement du lavage des mains. Lors de fortes chaleurs, l'aération des lieux clos doit se limiter aux heures les moins chaudes de la journée.

Semaine 33 (du 15 au 21 août 2022)

POINT DE SITUATION

En semaine 33, la circulation du SARS-CoV-2 a continué de ralentir, mais de façon moins marquée par rapport aux semaines précédentes, alors que le taux d'incidence demeurait supérieur à 200/100 000. En effet, la baisse de celui-ci était plus faible dans toutes les classes d'âge et une tendance à la stabilisation était observée dans certaines régions. En parallèle, le nombre d'admissions à l'hôpital poursuivait sa diminution. En Outre-mer, les indicateurs virologiques demeuraient très élevés et toujours en hausse à La Réunion. Il est primordial d'accentuer l'effort de vaccination pour améliorer la couverture vaccinale, qui demeure insuffisante, en particulier dans les DROM et chez les sujets âgés. Au 22 août, seuls 32,6% des 60-79 ans et 45,7% des 80 ans et plus avaient reçu leur seconde dose de rappel parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis leur dernière injection). De même, dans le contexte d'une circulation toujours active du SARS-CoV-2 et des congés estivaux, il est nécessaire d'appliquer les gestes barrières afin de protéger les plus vulnérables. Il demeure également essentiel de suivre les mesures préconisées en cas de symptômes, de test positif ou de contact à risque.

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

En S33, le taux d'incidence corrigé pour l'effet du jour férié (15 août) était de 211 cas pour 100 000 habitants, ce qui représentait un peu moins de 18 000 nouveaux cas par jour en moyenne. S'il a poursuivi sa diminution, celle-ci était moins marquée par rapport aux semaines précédentes (-7% vs -27% en S32) et était observée dans l'ensemble des tranches d'âge. Les taux restaient supérieurs à 200 dans toutes les classes d'âge, excepté chez les moins de 20 ans, où ils étaient les plus bas (84 pour les 0-9 ans et 118 pour les 10-19 ans). Les taux les plus hauts étaient observés chez les 50-59 ans (258, -5%), les 20-29 ans (255, -9%) et les 30-39 ans (256, -9%). Quant au taux de positivité, celui-ci a très faiblement diminué en S33 (20,1 %, -0,5 point). Cette baisse n'était observée que chez les 50 ans et plus, le taux était stable ou en hausse dans les autres classes d'âge. L'augmentation la plus marquée était constatée chez les 0-9 ans (19,9%, +1,5 point). Cet indicateur demeurait le plus élevé chez les 50-59 ans (24,3%, -0,4 point). Le taux de dépistage suivait la même tendance, montrant une diminution plus faible par rapport aux semaines précédentes (1 048, -5% vs -22% en S32). Il était toujours en baisse chez les moins de 60 ans et était stable ou en légère augmentation dans les autres tranches d'âge. Il restait le plus élevé chez les 90 ans et plus (1 988, +3%) et demeurait inférieur à 1 000 chez les 10-19 ans (755, -12%) et à 500 chez les 0-9 ans (423, -12%).

En S33, les recours pour suspicion de COVID-19 étaient en baisse aux urgences (2 547 vs 3 293 passages soit -23%) et dans les associations SOS Médecins (2 413 vs 2 694 actes soit -10%) pour la quatrième semaine consécutive.

Au niveau des indicateurs hospitaliers, une forte diminution était à nouveau constatée en S33 : 2 772 nouvelles admissions à l'hôpital étaient comptabilisées, soit une diminution de 27%. Les admissions en soins critiques étaient également toujours en baisse (286, -29%, données non consolidées). En outre, 304 décès à l'hôpital et en ESMS ont été déclarés en S33 (vs 460 en S32 soit -34%, données non consolidées).

En France métropolitaine, le taux d'incidence corrigé a continué de diminuer dans la plupart des régions. Il s'est

stabilisé en Auvergne-Rhône-Alpes (210, -2%), ainsi qu'en Bretagne (186, -3%), et a légèrement augmenté en Bourgogne-Franche-Comté (202, +7%). Il restait le plus élevé en Corse (344, -24%) et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (267, -16%). C'est toutefois dans ces mêmes territoires que la baisse était la plus forte. Les taux de nouvelles hospitalisations ont diminué dans toutes les régions métropolitaines. Ils restaient les plus élevés en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Corse et en Bourgogne-Franche-Comté.

En Outre-mer, les taux d'incidence corrigés étaient toujours en diminution en Guyane (57, -22%) et en Guadeloupe (264, -7%). La reprise épidémique s'est confirmée à La Réunion (754, +28%), avec une incidence à nouveau en hausse. Une augmentation était également constatée en Martinique (272, +14%). Quant au taux de nouvelles hospitalisations, celui-ci a diminué dans l'ensemble des régions, excepté à La Réunion, où il était en augmentation. C'est aussi dans ce territoire que le taux était le plus élevé (13,6/100 000, données non consolidées).

VARIANTS

Omicron circule de manière quasi exclusive en France, et son sous-lignage BA.5 est actuellement omniprésent. En métropole, BA.5 (tous sous-lignages confondus) représentait 94% des séquences interprétables lors de l'enquête Flash S32 (08/08). La proportion de BA.4 (tous sous-lignages compris) au cours des enquêtes Flash diminue, avec 5% des séquences interprétables au cours de Flash S32 contre 6% lors de Flash S31. La détection de mutations en position L452 par les tests de criblage reste stable à des niveaux élevés (93% en S33 vs 92% S32), en lien avec la circulation de BA.5. Des informations complémentaires sont disponibles dans [l'analyse de risque variants du 10/08/2022](https://www.sciensano.be/fr/analyse-de-risque-variants-du-10/08/2022).

PRÉVENTION

Au 22 août, les couvertures vaccinales étaient de 85,3% chez les 65 ans et plus pour la dose de rappel. Seuls 32,6% des 60-79 ans et 45,7% des 80 ans et plus, ainsi que 50,5% des résidents en Ehpad avaient reçu leur seconde dose de rappel parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis la dernière injection).

Où retrouver les graphiques et tableaux sur InfoCovidFrance ?

À compter du 14 juillet 2022, le Point épidémiologique hebdomadaire (PE-COVID-19) évolue vers un format resserré de trois pages qui fournit une vision globale de la dynamique de l'épidémie du COVID-19 en France.

Accédez directement aux graphiques et tableaux des indicateurs sur [InfoCovidFrance](#), où un rapport hebdomadaire est publié en complément du dashboard :

INDICATEURS HOSPITALIERS

- Les nombres hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques sont disponibles dans l'onglet « Chiffres Clés », sous l'onglet « Médecine de ville / Hôpital ». Ces indicateurs sont également présentés par taux dans l'onglet « Hôpital ».
- Les taux hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques, par classe d'âge, sont disponibles sous forme de deux courbes distinctes dans l'onglet « Hôpital ».

INDICATEURS EN ESMS (ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX)

Dans l'onglet « Établissement social et médico-social », sont disponibles :

- les couvertures vaccinales des résidents et des professionnels en Ehpad ou USLD (Unité de soins longue durée) ;
- le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés en ESMS chez les résidents et professionnels ;
- les décès hebdomadaires chez les résidents en ESMS.

DONNÉES VIROLOGIQUES AU NIVEAU NATIONAL

- Le graphique « Incidence et dépistage avec correction pour les jours fériés » est disponible dans l'onglet « Incidence ».
- Les *heatmaps* « Évolution des taux d'incidence par semaine et par classe d'âge » sont disponibles dans l'onglet « Incidence ».

DONNÉES VIROLOGIQUES AU NIVEAU RÉGIONAL

- Les tableaux « Évolution des taux d'incidence, de positivité et de dépistage par région » sont disponibles sous forme de courbes à l'échelle régionale et départementale dans l'onglet « Incidence ».

VARIANTS

- Le graphique « Évolution de la part de chaque variant au cours des enquêtes Flash » est disponible dans l'onglet « Variants ».

COUVERTURE VACCINALE

- Le graphique « Couverture vaccinale par classe d'âge » est disponible dans l'onglet « Vaccination ».

Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé Publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#)
Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#)
Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#)

Tableau de bord

[InfoCovidFrance](#)

Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le monde